

2019新型冠状病毒对于有限服务慈善派发食品业务 (LSCFO) 的指引

背景

COVID-19又称2019新型冠状病毒，这是一种呼吸系统疾病通过感染者的呼吸道飞沫或者接触感染的表面而进行传播。这种病毒的症状包括发烧，咳嗽，和/或者呼吸急促。

请查询卫生局的网页[EMD WEBSITE](#)以获取更多最新的资讯。

保护您自己和他人

有很多的方法可以减少传播2019新型冠状病毒的风险。沙加缅度卫生局建议遵循以下的指引：

- 当志愿者/员工有发烧，咳嗽，呼吸急促，肠胃不适或者有其他流感的症状，请留在家中。
- 确保在处理未被包装的食物时，随时都可以使用备有洗手液和纸巾的洗手盆。
- 经常洗手。在进行任何食物分配之前，准备食物，提供食物服务之前，在任何手可能被污染之后等。（更多内容信息，请往下看）
- 在任何公共场所内必须佩戴口罩，和在无法保持6英尺社交距离的室外也要佩戴口罩。在加利福尼亚州公共卫生部（CDPH）的《使用口罩指引》中可以找到口罩豁免的信息。
- 避免接触您的脸部，眼睛，鼻子，或者嘴巴。
- 通知所有志愿者和顾客与他人保持至少6英尺的距离。使用胶带标记，告示，圆锥物或其他方式来指出6英尺的距离。
- 确保食物来自经批准的来源（例如拥有卫生局（EMD）所颁发许可证的杂货店，餐馆或者其他食品地方）。
- 确保热的食品保持在135度或以上并且保持冷冻食品在41度或以下。
- 除去自助服务/自动餐式操作。
- 只提供外卖式派发；除去座位的可用性。
- 稀释1/3杯漂白水进入1加仑水里面，然后拿来定期清洁和消毒所有高流量接触的地方例如门把手，水龙头，柜檯面，桌子，洗手间等等。
- 当使用厨房/准备食物的区域，清洁和消毒被污染的表面，餐具和碗盘。至少每4个小时清洁和消毒一次。对于食物服务器材消毒液浓度的要求：100ppm漂白水（氯）或者200ppm季铵。

洗手

提醒志愿者/员工经常用洗手液和清水洗手至少20秒。确保可用的洗手盆有足够的洗手液和纸巾。应该在这个时候洗手：

- 在进入食物准备区域的时候
- 在开始准备食物之前
- 在接触脸部，头发，或者身体其他地方以后
- 在用完洗手间以后
- 在咳嗽，打喷嚏，用纸巾擤鼻涕，吸烟，吃饭，喝饮料/水，调整口罩等等以后
- 在处理生肉和即食食物转换之间
- 在戴上手套之前
- 在清洁，收拾桌子，或者接触任何顾客用过的东西以后
- 在处理现金/信用卡/笔/收据和处理食物之间
- 如果分发食物给顾客，建议员工/志愿者在顾客之间洗手或者使用洗手消毒液
 - ☞ 洗手消毒液建议在洗手后使用



提示!

- ☞ 指派一位员工在每轮换班的时候检查且保持足够的洗手液和纸巾在洗手盆上
- ☞ 提供洗手消毒液给顾客使用

有限服务慈善派发食品业务

有关有限服务慈善派发食品业务的信息/问题请联系 *Monica Boatright, REHS 916-875-8440*

更多资讯

随着有关该病毒及其传播的更多的了解，与2019新型冠状病毒有关的信息和要求可能会发生变化。其他信息，数据报告和网站链接可以在沙加缅度卫生局的网页上找到 [Sacramento County Department of Health Services webpage](#).

- [加利福尼亚州公共卫生部佩戴口罩指引](#)
- [加利福尼亚州公共卫生部2019新型冠状病毒更新](#)
- [沙加缅度县公共卫生控制面板](#)
- [疾病控制中心：商业和雇主对于2019新型冠状病毒应对](#)
- [环境局批准对于2019新型冠状病毒的消毒剂](#)

Translated: 9/21/20

PHO: 8/31/20